

Kako primijeniti Vašu injekciju Pregnyl®

Vaše pakiranje s Pregnylom treba sadržavati:

- 3 zasebne ampule sa suhom tvari od 5000 IU + 3 zasebne ampule s tekućinom.
- Nadalje, potrebna Vam je brizgalica od 2 ml, ružičasta igla za izvlačenje i miješanje i siva igla za ubrizgavanje.

1. Izvadite 2 ampule sa suhom tvari (10.000 IU) i jednu ampulu s tekućinom.
2. Kucnite vrh ampule s tekućinom tako da tekućina padne na dno. Zatim odlomite vrhove ampula.
3. Pričvrstite ružičastu iglu na brizgalicu i izvucite tekućinu iz ampule s tekućinom.
4. Ubrižgajte svu tekućinu u jednu od ampula sa suhom tvari. Prah se mora potpuno otopiti u tekućini.
5. Zatim ponovo uvucite tekućinu. Ubrižgajte otopinu u drugu ampulu s prahom, provjerite je li prah potpuno otopljen i ponovo uvucite otopinu u brizgalicu.
6. Kvrnite brizgalicu da biste uklonili zrak i pričvrstite sivu iglu.
7. Injekcija se daje potkožno u abdominalni masni sloj na isti način kao i injekcija Puregon-a. Ova injekcija može peći i/ili izazvati više crvenila od injekcije Puregon-a.