

# วิธีฉีดยา Pregnyl®

## ท่านควรได้รับกล่องยา Pregnyl บรรจุ:

- หลอดบรรจุยาผงขนาด 5000 หน่วย จำนวน 3 หลอด + หลอดยาฉีดบรรจุสารละลาย สำหรับผสมยาจำนวน 3 หลอด
  - นอกจากนั้นท่านต้องได้หลอดฉีดยาขนาด 2 มล. จำนวนหนึ่งหลอด พร้อมเข็มสีชมพู สำหรับใช้ผสมยา และเข็มสีเทาสำหรับใช้ฉีดยา
1. นำหลอดบรรจุยาผงจำนวน 2 หลอด (10,000 หน่วย) และหลอดบรรจุสารละลายหนึ่ง หลอดออกจากกล่อง
  2. เคาะที่ด้านบนของหลอดบรรจุสารละลายให้ไหลมารวมกันอยู่ที่ก้นหลอด จากนั้นตัด ด้านบนของหลอดออก
  3. ใส่เข็มสีชมพูกับหลอดฉีดยาแล้วดูดสารละลายในหลอดออกมา
  4. ฉีดสารละลายทั้งหมดลงในหลอดบรรจุยาผง แล้วเขย่าให้เนื้อยาละลายเข้ากันจนหมด
  5. จากนั้นใช้เข็มดูดยาที่ละลายในหลอดแล้วฉีดลงในหลอดบรรจุยาผงอีกหลอด เขย่าให้ ละลายเข้ากันจนหมด แล้วดูดเข้าหลอดฉีดยาทั้งหมด
  6. เคาะที่หลอดฉีดยาเพื่อไล่อากาศแล้วเปลี่ยนเข็มเป็นสีเทา
  7. ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังที่ชั้นไขมันบริเวณช่องท้องเหมือนกับการฉีดยา Puregon การฉีดยานี้อาจเจ็บและ/หรือทำให้เป็นรอยแดงมากกว่าการฉีดยา Puregon