



طرز مصرف Orgalutran®

بی‌فرزندی ناخواسته عارضه‌ای است که بیش از نیم میلیون نفر در سوئد بدان دچارند. بسیاری از مردم دوست دارند بچه دار شوند و چنانچه به خواسته‌ی خود نرسند، گاه این مسأله را بسیار ناگوار می‌یابند. با کمک فن‌آوری پیشرفته و داروهای نوین، امروزه امکان پاری رساندن به بسیاری از زوجها برای فرزندان شدن، فراهم می‌باشد.


Puregon® فرآورده‌ای از دسته‌ی هورمونهای تحریک‌کننده‌ی فولیکولی (FSH) می‌باشد که توسط شرکت Organon تولید می‌شود و در شرایط کنترل‌شده، برای تحریک رشد و بلوغ تخمکها بکار می‌رود. Orgalutran از آزدسازی و ترشح زود هنگام هورمون LH (هورمون لوتنین ساز) جلوگیری می‌کند. هدف از این بروشور آشنایی مصرف‌کننده با چگونگی استفاده از Orgalutran می‌باشد. جهت آشنایی مصرف‌کنندگان با Puregon نیز، بروشور همانندی در دسترس است.



۱. بسته بندی محتوی Orgalutran را بیرون بیاورید. همواره پیش از تزریق، محلول را بررسی نمایید. محلول باید فاقد هرگونه ذرات خارجی باشد.



۲. Orgalutran باید در زیر پوست تزریق گردد. بهترین محل برای تزریق، اندکی سمت راست یا چپ پوست زیر ناف، می‌باشد. محل تزریق را هر روز کمی تغییر دهید. نیازی به ضدعفونی کردن محل تزریق نیست.



۳. با فشردن پوست در میان انگشتان نشانه و شست، محل تزریق را برآمده سازید. سرنگ را مانند مداد در دست بگیرید و همانگونه که پرستارتان پیشتر به شما نشان داده، همه‌ی سوزن را با یک فشار عمودی و محکم بزیر پوست وارد نمایید. با فشار یکنواخت و آهسته به پیستون، سرنگ را تخلیه نمایید. سپس، سوزن را بیرون کشیده و محل تزریق را خشک نمایید.

Orgalutran چیست؟

Orgalutran یک آنتاگونیست GnRH (خنثی‌کننده‌ی اثر هورمون آزدکننده‌ی گونادوتروپین‌ها) می‌باشد. Orgalutran بصورت سرنگهای "از پیش مخلوط شده" تهیه شده است. ازینرو مصرف آن آسان می‌باشد. Orgalutran به همراه Puregon مصرف می‌شود و در بسته‌های یک یا پنج تایی موجود می‌باشد.

Orgalutran چگونه مصرف

میشود؟

۱. Orgalutran روزانه یکبار، و هر بار تقریباً همزمان با روز پیش، تزریق می‌گردد.
۲. پزشک معالج تصمیم می‌گیرد که بیمار در چه روزی مصرف Orgalutran را آغاز نماید.
۳. Orgalutran در پوست زیر ناف تزریق می‌شود که میبایستی محل تزریق با روز پیش تفاوت نماید. همچنین نباید Puregon و Orgalutran را در یک محل، تزریق نمود.
۴. پزشک معالج یا متخصص کودکان، بیمار را از زمان آخرین تزریق Orgalutran، آگاه خواهد نمود.

Orgalutran را باید چگونه

نگهداری نمود؟

Orgalutran دارویی حساس به نور بوده و باید در بسته بندی خود و در دمای اتاق نگهداری شود. فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره‌ی موارد مصرف و شرایط تأثیر Orgalutran، به برگه راهنمای داخل بسته بندی فرآورده مراجعه نمایید.

Orgalutran®

ganirelix

مایع تزریقی بصورت محلول
۰/۲۵ میلی‌گرم در ۰/۵ میلی‌لیتر

Schering-Plough